

内視鏡検査(上部消化管内視鏡) 胃カメラ検査について



医療法人社団 清澄会
ミタ二病院

① 検査前の注意




- **前日の21時以降** は、食事をしないでください。
- 当日はコップ1杯の水以外は摂らず、抗不整脈薬、降圧剤等の心臓の薬、精神科の薬以外は飲まないでください。また内服されている薬の一覧表か現物をご持参ください。また脳血栓や心筋梗塞等で血液が固まりにくくなる薬を服用されている方は、前もってお知らせください。



当日はコップ1杯の水



21時以降は食事をとらない



禁煙、禁酒されている方は、朝から禁煙、禁酒をしてください。

義歯をされている方は検査直前に義歯を外し、女性の方は口紅を落としてください。

体を締め付けない楽な服装でご来院ください。

(健康診断の場合は検査着をお渡しします。)



禁煙、禁酒



義歯を外す



口紅を落とす

※ 気温が高い日などは、汗で水分が失われますので、2時間前ならば、のどが渴かないように少量ずつこまめに水分補給をしてください。

偶発症について


細心の注意を払って検査を行いますが、この検査ではのどの麻酔薬によるショック、内視鏡検査・組織検査による出血や穿孔などが起こる可能性があります。

気になる症状があれば当院にご連絡ください。

② 検査後の注意



- 喉に麻酔が効いていますので、検査後1時間は絶飲絶食です。少量の水分を飲み込み、むせなければ食事をしてかまいません。組織検査を受けた方は、当日飲酒を避け、刺激が少なく、消化の良いものを食べるように心がけてください。



ご不明点がございましたら、**お気軽にお問い合わせください。**

医療法人社団 清澄会
ミタ二病院

平日 9:00 ~ 17:00
休診日: 日・祝祭日・木曜日午後



[健診直通]

TEL. 087-864-8821

下記の薬剤を服用されている方は、

検査日までに所定の期間主治医の許可を得て、薬剤の服用を中止してください。

内視鏡的組織生検時、出血しやすく、出血が止まらない場合もあります。


商品名		休薬期間
抗凝固剤	ワーファリン等	3～4日
抗血小板剤	バイアスピリン	3～7日
	バファリン	5～7日
	バナルジン	5～7日
	クロピドグレル（プラビックス）	1～2日
	ドルナー	2日
注射剤	プロサイリン	事前の中止
	アンプラーグ	処置前の投与の中止
	ペルサンチン等	
	ヘパリン	
	ウロキナーゼ等	




局所麻酔について

上部消化内視鏡検査（胃カメラ）を行う際、経口の場合は咽頭、経鼻の場合は鼻腔に局所麻酔をします。以前歯医者等で行った際に体調が悪くなったことがある場合、この麻酔ができない可能性がありますので、事前にご連絡ください。

※現在、胃カメラ検査を医師1名で対応しております。医師の都合により日にちの変更をお願いする場合がございます。予めご了承ください。



経口の場合は咽頭



経鼻の場合は鼻腔

胃カメラ検査をされる方へお願い

昨年度、胃カメラを予約をお取りしているお客様の中で日程の忘れ等で健診当日にキャンセルをせざるを得ない事例が多く生じました。

皆様も感じておられると存じますが現在胃カメラのご予約が非常に取りにくい状況となっております。

1人でも多くの方に胃カメラの検査をご提供できればと考えておりますのでご協力の程よろしくお願い申し上げます。

会社様の御担当者様からご予約をして頂いた場合

御担当者様の

方で日程の確認をしていただき健診日に近いお日にちでご本人様にアナウンスをして頂くなどのご協力をお願いいたします。

受診者本人からご予約をして頂いた場合

事前に送付する準備物を十分ご確認頂き、日程管理の徹底をお願いいたします。

キャンセルや日程の変更が必要となった場合は分かった時点でご連絡ください。

ただし空き状況により変更の希望日に対応ができない可能性も十分ございますのでご了承ください。

※体調不良のようなやむを得ない場合は無理をせずご連絡ください。

既にご協力いただいている会社様や受診者様におかれましては心より感謝申し上げます。当院の都合により受け入れが不可能な日や、お日にちの変更をお願いする可能性もある中で大変恐縮ではございますが上記の件につきましてご協力の程よろしくお願い申し上げます。